

Atemskala

Bewertung: 0-6 Punkte = nicht gefährdet, 7-15 Punkte = gefährdet, 16-45 Punkte = hochgradig gefährdet, manifeste Atemstörung

Bereitschaft zur Mitarbeit	Pkt.	Vorliegende Lungenerkrankung	Pkt.	Frühere Lungenerkrankungen	Pkt.	Immunschwäche	Pkt.	Raucher/ Passivraucher	Pkt.	Schmerzen	Pkt.	Schluckstörung	Pkt.	Manipulative oro-tracheale Maßnahmen	Pkt.
kontinuierliche Mitarbeit	0	keine	0	keine	0	keine	0	Nichtraucher, geringes Passivrauchen	0	keine	0	keine	0	keine	0
Mitarbeit nach Aufforderung	1	leichter Infekt im Nasen-/Rachenraum	1	leichte (z.B. bronchopulmonale grippale Infekte)	1	leicht (z. B. lokale Infekte)	1	pro Tag 6 Zig. (light) oder regelmäßiges Passivrauchen	1	leichte, Dauerschmerzen	1	bei flüssiger Nahrung	1	Pflegemaßnahmen, z.B. Nasen- und Mundpflege	1
nur nach Aufforderung	2	Bronchialinfekt	2	schwere Verläufe	2	erhöht	2	pro Tag 6 Zig. (normal) oder regelmäßiges Passivrauchen (z.B. Rauchen des Partners)	2	mäßige atembeeinflussende Schmerzen	2	bei breiiger Nahrung	2	oro- nasale Absaugung	2
keine	3	Lungenerkrankung	3	schwere Lungenerkr. mit bleibender Atemfunktionseinschränkung	3	völlig	3	mehr als 6 Zig., ständiges Passivrauchen	3	starke atembeeinflussende Schmerzen	3	komplette Schluckstörung, auch beim Schlucken von Speichel	3	orale / nasale / endotracheale Absaugung ohne oder mit liegendem Tubus	3

Mobilitäts-einschränkung	Pkt.	Beruf	Pkt.	Intubationsnarkose, Beatmung	Pkt.	Bewusstseinslage	Pkt.	Atem-Anstrengung	Pkt.	Atemfrequenz	Pkt.	Atemdepressive Medikamente	Pkt.	Bemerkung
keine	0	kein lungengefährdender Beruf	0	In den letzten drei Wochen keine	0	keine Einschränkungen	0	ohne Anstrengung	0	14-20 Atemzüge	0	keine	0	
eingeschränkte Mobilität durch Gehhilfen kompensierbar	1	gefährdender Beruf für 1-2 Jahre	1	kurze Intubationsnarkose (bis 2 h)	1	leichte Einschränkung	1	mit Anstrengung	1	unregelmäßige Atmung	1	unregelmäßige Einnahme (geringe Atemdepression)	1	
stark eingeschränkt	2	für 2-10 Jahre	2	langandauernde Intubationsnarkose (über 2 h)	2	reagiert auf Ansprache nicht folgerichtig	2	Atmung mit großer Hilfestellung	2	regelmäßige aber Bradyпноe oder Tachypноe	2	regelmäßige Einnahme (mäßige Atemdepression)	2	
völlig	3	für über 10 Jahre	3	mehrere Narkosen oder mehr als 12 h Beatmung	3	keine Reaktion	3	keine Atmung möglich	3	sehr unregelmäßige Atmung (flach, tief, Schnell)	3	regelmäßige Medi. (Opiate, Barbiturale)	3	

Auswertung/ Evaluierung

Kriterium	Pkt.	Kriterium	Pkt.
Bereitschaft zur Mitarbeit		Mobilitätseinschränkung	
Vorliegende Lungenerkr.		Beruf	
Frühere Lungenerkr.		Intubationsnark., Beatmung	
Immunschwäche		Bewusstseinslage	
Raucher/ Passivraucher		Atem- Anstrengung	
Schmerzen		Atemfrequenz	
Schluckstörung		Atemdepressive Medi.	
Manipulative oro-tracheale Maßnahmen		Gesamtsumme:	
Datum:		Hdz.	

Kriterium	Pkt.	Kriterium	Pkt.
Bereitschaft zur Mitarbeit		Mobilitätseinschränkung	
Vorliegende Lungenerkr.		Beruf	
Frühere Lungenerkr.		Intubationsnark., Beatmung	
Immunschwäche		Bewusstseinslage	
Raucher/ Passivraucher		Atem- Anstrengung	
Schmerzen		Atemfrequenz	
Schluckstörung		Atemdepressive Medi.	
Manipulative oro-tracheale Maßnahmen		Gesamtsumme:	
Datum:		Hdz.	

Kriterium	Pkt.	Kriterium	Pkt.
Bereitschaft zur Mitarbeit		Mobilitätseinschränkung	
Vorliegende Lungenerkr.		Beruf	
Frühere Lungenerkr.		Intubationsnark., Beatmung	
Immunschwäche		Bewusstseinslage	
Raucher/ Passivraucher		Atem- Anstrengung	
Schmerzen		Atemfrequenz	
Schluckstörung		Atemdepressive Medi.	
Manipulative oro- tracheale Maßnahmen		Gesamtsumme:	
Datum:		Hdz.	